


LO SCALING

TRATTAMENTO PARODONTALE NON CHIRURGICO




In condizioni normali, la parte superiore della gengiva è staccata dal dente per un'altezza di circa 2-3 mm (solco gengivale).

Nel caso di **malattia parodontale**, questo spazio può aumentare formando una **tasca parodontale** dove si accumula la placca batterica e l'igiene risulta difficile.

IL SONDAGGIO PARODONTALE

è essenziale per distinguere la gengivite dalla parodontite. Si esegue con una sonda che, inserita tra dente e gengiva misura la profondità in millimetri della tasca parodontale. (più profonda è la tasca, più grave è la parodontite).



QUANDO SI EFFETTUA QUESTO TRATTAMENTO

- Come terapia alternativa al trattamento chirurgico in pazienti con tasche parodontali fino a 6 mm.
- All'insorgere di problemi di *alitosi*, *sanguinamento gengivale*, *dolore e gonfiore alle gengive* dovuto ad infiammazione.

IN COSA CONSISTE

- Vengono effettuate 4 sedute durante le quali la placca e il tartaro attorno e al di sotto della linea gengivale vengono rimossi usando uno strumento manuale detto "curette" e uno strumento ad ultrasuoni. Si procede quindi con la levigatura radicolare che favorisce il riattacco della gengiva alla superficie pulita e liscia della radice del dente e rende più difficile il nuovo accumulo di placca.
- Il trattamento è reso più confortevole da un'anestesia locale.

OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO

- Ci si aspetta un miglioramento delle tasche di uno due millimetri, l'arresto o la diminuzione del sanguinamento, gengive più sane e denti più protetti.
- In relazione al problema e alla gravità dello stesso **il trattamento potrebbe non essere risolutivo** e molto dipende dalla reazione dei tessuti

ISTRUZIONI POST-TRATTAMENTO

- Non fumare per almeno 12 ore;
- Usare uno spazzolino a setole medie con testina piccola almeno 2 volte al giorno soprattutto la sera;
- Usare filo interdentale ogni sera;
- Usare il collutorio con clorexidina 0,12% per 15 giorni per 2 volte al giorno, in particolare la sera.

EFFETTI COLLATERALI

- Il paziente può avere **sensibilità temporanea** dopo il trattamento per la prima settimana. Tale sensibilizzazione cesserà spontaneamente e può essere coadiuvata con prodotti appositi (Elmex Gel al fluoro)
- Nei giorni immediatamente successivi il trattamento potrebbe verificarsi un **ritiro gengivale** di 1/2 millimetri e relativa sensibilità dentale.
- Durante il periodo di utilizzo del collutorio potrebbero comparire delle piccole macchie sui denti che verranno successivamente rimosse con seduta di igiene orale professionale.
- Eventuali lievi stati di dolore o fastidi possono essere trattati con antidolorifici.

DR.SSA BELLOTTO SILVIA, Igienista dentale



POLIAMBULATORIO ORTODONT

**CENTRO MEDICO CHIRURGICO
IMPLANTOLOGICO DEL VENETO**

